

2,4-dinitrophényl-carbonate

Synonyme :


Famille : -

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

2,4-DINITROPHENYL-CARBONATE
04/02/2013

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>	1966	1973	Pois	X		
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	1966	1973	Haricot	X		
Cultures ornementales	1966	1973	Glaïeul	X		
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses						
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

2,4-DINITROPHENYL-CARBONATE
04/02/2013

Caractéristiques (1973) :

- action : par contact
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : Monocotylédones et dicotylédones
- persistance d'action : -

Toxicité (1973) : élevée

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		Tableau C DL50 rat par ingestion : 108 mg/kg						
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Tribonate (1963)

Évolution de formulation : -