

**Acide A-naphtylacétique**

Synonyme : ANA


Famille : Aryloxy-acides

Groupe : Substances de croissance

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 <sup>er</sup> janvier 2012			

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

ACIDE A-NAPHTYLACETIQUE  
06/03/2013

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>	1961	→	Pommier, poirier	X	X	Naphtoxy-2-acétamide
<i>A noyaux</i>	1961	→	Pêcher, prunier	X	X	Naphtoxy-2-acétamide
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>	1961	→	Culture maraichère, tomate, courgette	X	X	Naphtoxy-2-acétamide
<b>Cultures ornementales</b>	1961	→	Arbres et arbustes d'ornement, pélargonium, rosier, cultures florales diverses	X	X	Naphtoxy-2-acétamide
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>	1961	→		X	X	Naphtoxy-2-acétamide
<b>Cultures diverses</b>						
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

ACIDE A-NAPHTHYLACETIQUE  
06/03/2013

Caractéristiques (2013) :

- action : hormonale
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : arboriculture fruitière, culture maraichère, culture ornementale
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) : -

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule	-	-	-	-	-	-	-	-
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Rootone (1961)

Évolution de formulation : WP