

Acide folique

Synonyme :


Famille : -

Groupe : Biostimulants des productions végétales

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>	1983	1995			X	L-cysteine
<i>Protéagineux</i>	1983	1995	Pois		X	L-cysteine
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>	1983	1995	Pommier, poirier		X	L-cysteine
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	1983	1995	Tomate, haricot, ail, oignon, poivron, aubergine, concombre, melon		X	L-cysteine
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses						
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (1995) :

- action : biostimulant agissant sur les facteurs endogènes
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : large
- persistance d'action : -

Toxicité (1995) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule	-	-				-	-	-
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Ergostim (1981)

Évolution de formulation : SL