

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières						
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses	1978*	2008	Ensilage de graminées fourragères, légumineuses, prairies permanentes	X	X	Aldéhyde formique Acide phosphorique Acide sulfurique
Traitements généraux						

* Usage non présent dans l'index de 1991 à 2002 inclus

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (1990) :

- action : bactériostatique
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : -
- persistance d'action : -

Toxicité (1990) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule	-	-				-	-	-
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Formira (1974)

Évolution de formulation : AL