

**Aclonifen**

Synonyme : Aclofen


Famille : Diphényl-éthers

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 <sup>er</sup> aout 2009			

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>	1993	→			X	Alachlore Isoxaflutole
<i>Oléagineux</i>	1988	→	Tournesol	X	X	***
<i>Pomme de terre</i>	1989	→		X	X	Alachlore
<i>Protéagineux</i>	1989	→	Pois protéagineux et féverole d'hiver et de printemps, lentille	X	X	Flurtamone Oxadiazyl
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>	1994	→	Ail, oignon, échalote, pois de conserves, maïs doux, fenouil, persil, topinambour...	X		
<b>Cultures ornementales</b>						
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>	2002	→			X	Amminotriazole
<b>Cultures diverses</b>	2004	→	PPAM, tabac	X		
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : par contact
- solubilité dans l'eau : 2,5 mg/l à 20°C
- spectre : Graminées et dicotylédones
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : >5000 mg/kg	DJA : 0,02 mg/kg/kg				R50/53	
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Challenge 600 (1986)

Évolution de formulation : SC