

Benfluraline

Synonyme :


Famille : Amides, Amines (toluidines)

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} mars 2009			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>	1985	→	Pois protéagineux de printemps et d'hiver	X		
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	1976	→	Chicorée, endive à café, haricot, pois de conserve, scorsonère-salsifis	X		
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses	1974	→	Luzerne	X		
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : racinaire
- solubilité dans l'eau : <1 mg/l à 25°C
- spectre : Graminées et dicotylédones annuelles
- persistance d'action : 4 à 8 mois

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : >10000 mg/kg/jour		Xi R36	R43		R50/53	
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Bonalan (1971)

Évolution de formulation : EC