

**Benzoximate**

Synonyme : Benzomate


Famille : Dérivé de l'acide benzhydroxamique

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>	1974	2003	Pommier, poirier	X		
<i>A noyaux</i>	1974*	2003	Prunier	X		
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>	1994	2003	Amandier, noyer	X		
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>	1974	2003	Melon	X		
<b>Cultures ornementales</b>	1979	2003	Rosier	X		
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>	1974	2003		X		
<b>Cultures diverses</b>	1974	1978	Houblon	X		
<b>Traitements généraux</b>						

\* Usage non présent dans l'index de 1982 à 1993 inclus

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2003) :

- action : par contact et ingestion
- solubilité dans l'eau : insoluble dans l'eau
- spectre : acarien
- persistance d'action : longue

Toxicité (2003) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 > 15000 mg/kg	DJA : 0,2 mg/kg/jour					Dangereux poisson
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Artaban

Évolution de formulation :