

**Bicarbonate de potassium**

Synonyme :


Famille : Produits minéraux

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

BICARBONATE DE POTASSIUM  
19/06/2013

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>	2013	→	Cassissier, framboisier et autres rubus, groseilliers	X		
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>	2013	→	Concombre, cornichon, courgette, fraiser	X		
<b>Cultures ornementales</b>						
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>	2013	→		X		
<b>Cultures diverses</b>	2013	→	PPAM, porte- graine mineures	X		
<b>Traitements généraux</b>						

BICARBONATE DE POTASSIUM  
19/06/2013

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

BICARBONATE DE POTASSIUM  
19/06/2013

Caractéristiques (2013) :

- action : par contact
- solubilité dans l'eau : 332 g/l à 20°C
- spectre : Oïdium, tavelure, botrytis
- persistance d'action : 7 à 10 jours

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : 2064 mg/kg/jour						
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Amicarb (2011)

Évolution de formulation : non