

Binapacryl

Synonyme : Dapacryl (1962)


Famille : Benzènes

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
			Non listée

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>	1962	1988	Pommier	X		
<i>A noyaux</i>	1962	1981		X		
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	1962	1987	Melon	X		
Cultures ornementales	1971	1987	Rosier	X		
Cultures tropicales						
Viticulture	1962	1968		X		
Cultures diverses	1962	1968	Houblon	X		
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (1991) :

- action : par contact
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : acarïens
- persistance d'action : -

Toxicité (1991) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		Modérément dangereux tab C DL50 pour le rat par ingestion : 150 mg/kg						Dangereux poisson
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Endosan (1960)

Évolution de formulation : non