

Bromadiolone

Synonyme :


Famille : Coumarines

Groupe : Rodenticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} juin 2011			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

BROMADIOLONE
05/07/2013

AUTRES

	1 ^{ere} édition	Dernière édition	Formulation	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Rodenticides	1976	→	Concentrats huileux, appâts	X		
Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : par ingestion
- solubilité dans l'eau : 19 mg/l à 20°C
- spectre : Divers rongeurs
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R26/27/28 T+ DL50 rat par ingestion : 1,125 mg/kg					R50/53	Dangereux pour le gibier les animaux domestiques
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Super Caïd concentrat (1975)

Évolution de formulation : CB, RB, BB