

Captane

Synonyme :


Famille : Phtalimides

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} octobre 2007			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>	1961	→	Pommier, poirier, cognassier, nashi	X	X	Trifloxystrobine
<i>A noyaux</i>	1961	→	Abricotier, cerisier, nectarinier, pêcher, prunier	X	X	Trifloxystrobine
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>	1994	1999	Amandier	X		
Cultures forestières						
Cultures légumières	1974*	→	Carotte, tomate	X		
Cultures ornementales	2013	→	Arbres et arbuste d'ornement	X		
Cultures tropicales						
Viticulture	1961	2011		X		
Cultures diverses						
Traitements généraux						

* Usage non présent dans l'index de 1993 à 2012 inclus

AUTRES

Traitement de semences	1961	→	Glaïeul, grandes cultures, haricot	X	X	***
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

CAPTANE (Fongicide)
05/06/2013

Caractéristiques (2013) :

- action : préventif de contact
- solubilité dans l'eau : 3,3 mg/l à 25°C
- spectre : nombreuses maladies cryptogamiques
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R23 DL50 rat par ingestion : 9000 mg/kg	R40 DJA : 0,01 mg/kg/jour	R41	R43		R50	Dangereux pour les poissons
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Orthocide 50 (1952)

Évolution de formulation : WP,SC, WG