

Chloroxuron

Synonyme : Chlorophénocarbe


Famille : Urées substituées

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

| INSCRITE | NON INSCRITE | REVISION | |
|----------|--------------|----------|--|
| | | | |

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

| | 1 ^{ère} édition | Dernière édition | Cultures particulières | Utilisation seule | Utilisation en associations | Remarques |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------------------|----------------|
| Grandes cultures | | | | | | |
| <i>Betterave</i> | | | | | | |
| <i>Céréales</i> | | | | | | |
| <i>Maïs</i> | | | | | | |
| <i>Oléagineux</i> | | | | | | |
| <i>Pomme de terre</i> | | | | | | |
| <i>Protéagineux</i> | 1963 | 1991 | Pois | X | | |
| Arbres fruitiers | | | | | | |
| <i>A pépins</i> | | | | | | |
| <i>A noyaux</i> | | | | | | |
| <i>Petits fruits</i> | | | | | | |
| <i>Agrumes</i> | | | | | | |
| <i>Autres</i> | | | | | | |
| Cultures forestières | | | | | | |
| Cultures légumières | 1963 | 1991 | Carottes, fraisier, poireaux, céleri | X | | |
| Cultures ornementales | 1985 | 1999 | Gazons de graminées | | X | Sulfate de fer |
| Cultures tropicales | | | | | | |
| Viticulture | | | | | | |
| Cultures diverses | | | | | | |
| Traitements généraux | | | | | | |

AUTRES

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Traitement de semences | | | | | | |
| Traitement de sols | | | | | | |
| Denrées entreposées | | | | | | |
| Locaux de stockage | | | | | | |
| Bâtiments d'élevage | | | | | | |

Caractéristiques (1999) :

- action : par contact et racinaire
- solubilité dans l'eau : 3,7 mg/l à 20°C
- spectre : Dicotylédones
- persistance d'action : 1 à 3 mois

Toxicité (1999) :

| | Physicochimie | Toxicité | | | | Écotoxicité | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------|----------|---------------|-------------|-----------|----------|
| | Inflammabilité | Aiguë | Chronique | Irritant | Sensibilisant | N | Phrases R | Mentions |
| Molécule | | DL50 rat par ingestion : > 3000 mg/kg | | | | | | |
| Spécialités | | | | | | | | |

1^{ère} spécialité commerciale : Ténoran (1962)

Évolution de formulation : SC