

Coumachlore

Synonyme :


Famille : Dérivés de l'hydroxycoumarine

Groupe : Rodenticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'i

AUTRES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Formulation	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Rodenticides	1969	1989	Appâts	X		
Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (1989) :

- action : par ingestion
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : surmulot, rat noir, souris domestique, rat musqué
- persistance d'action : -

Toxicité (1989) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		Tableau A ou C DL50 rat par ingestion : 900 à 1200 mg/kg						
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Tomorin poudre (1964)

Évolution de formulation : TP