

Cycloxydime

Synonyme :


Famille : Cyclohexane-diones

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} juin 2011			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>	1990	→	Betterave industrielle et fourragère	X		
<i>Céréales</i>						
<i>Mais</i>	2001	→		X		
<i>Oléagineux</i>	1990	→	Colza, soja, tournesol	X		
<i>Pomme de terre</i>	1991	→		X		
<i>Protéagineux</i>	1990	→	Pois protéagineux de printemps et d'hiver	X		
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	1990	→	Pois de conserve, laitue, céleri, poireau, carotte, haricot, tomate, chou, oignon...	X		
Cultures ornementales	2007	→	Jacinthe, lys, tulipe, cultures florales diverses	X		
Cultures tropicales						
Viticulture	1991	→		X		

CYCLOXYDIME
23/01/2013

Cultures diverses	1990	→	Lin textile, riz, PPAM, pavot oeillette, trèfle, luzerne	X		
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : par systémie
- solubilité dans l'eau : 40 mg/l à 20°C
- spectre : Graminées
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : 3940 mg/kg	DJA : 0,06 mg/kg/jour				R52	
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Stratos (1988)

Évolution de formulation : -