

Cymoxanil

Synonyme : Curzate, Cyano Ethylaminocarbonyl Methoxyimino Acétamide, DPX 3217


Famille : Acétamides

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} septembre 2009			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Mais</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>	1980	→		X	X	***
<i>Protéagineux</i>	1983	2002			X	***
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	1982	→	Tomates, Pois, Laitue, Divers		X	***
Cultures ornementales	1983	2013	Glaïeul		X	Mancozèbe
Cultures tropicales						
Viticulture	1978	→			X	***
Cultures diverses	1983	→	Houblon, Cultures mineures, cultures porte-graine, Pavot œillette		X	Mancozèbe, Oxadixyl, Manèbe, Cuivre
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences	1987	→	Pois, Arbres et arbustes d'ornement, Chicorée chicon, Fèves, Lupin		X	***
Traitement de sols	1992	2003	Arbres et arbustes d'ornement		X	Oxadixyl
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2010) :

- action : contact, pénétration locale dans la plante
- solubilité dans l'eau : 1000 mg/l à 25°C
- spectre : *Mildiou, black rot, excoriose, brenner de la vigne, mildiou de la pomme de terre*
- persistance d'action : -

Toxicité (2010) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 1425 mg/kg R22	DJA 0,05 mg/kg/jour		R43		R50/53	
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Fulvax (1977)

Évolution de formulation :