

Diméthénamide

Synonyme :


Famille : Acétamides

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

DIMÉTHÉNAMIDE
21/01/2013

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>	1994	2008		X	X	Atrazine Pendiméthaline
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières						
Cultures ornementales	1999	2008	Gazon de graminées	X		
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses						
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

DIMÉTHÉNAMIDE
21/01/2013

Caractéristiques (2008) :

- action : racinaire
- solubilité dans l'eau : 1389 mg/l à 22°C
- spectre : Nombreuses graminées et dicotylédones
- persistance d'action : 3 mois

Toxicité (2008) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R22 DL50 rat par ingestion : 1500 mg/kg	DJA : 0,04 mg/kg/jour	Xn	R43		R50	
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Frontière (1991)

Évolution de formulation : SL