

**Diméthachlore**

Synonyme :


Famille : Chloroacétanilides

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 <sup>er</sup> octobre 2010			

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>	1979	→	Colza		X	Clomazone Napropamide
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>						
<b>Cultures ornementales</b>						
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>						
<b>Cultures diverses</b>	2013	→	Chanvre porte- graine		X	Napropamide Clomazone
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

<b>Traitement de semences</b>						
<b>Traitement de sols</b>						
<b>Denrées entreposées</b>						
<b>Locaux de stockage</b>						
<b>Bâtiments d'élevage</b>						

Caractéristiques (2013) :

- action : racinaire
- solubilité dans l'eau : 2,3 g/l à 25°C
- spectre : Nombreuses graminées et dicotylédones annuelles
- persistance d'action : environ 2 mois

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R22 DL50 rat par ingestion : 1600 à 2000 mg/kg	DJA : 0,12 mg/kg/jour	Xn	R43		R50/53	
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Tériдох (1975)

Évolution de formulation : EC