

Dithianon

Synonymes :


Famille : Quinones

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} juin 2011			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>	1967	→	Pommier, poirier...	X		
<i>A noyaux</i>	1967	→	Abricotier, pêcher, prunier, cerisier	X		
<i>Petits fruits</i>	1971*	→	Cassissier, groseillier, framboisier...	X		
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>	1994	→	Amandier, noyer	X		
Cultures forestières						
Cultures légumières	1970	1989		X		
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture	1979	→		X	X	Diméthomorphe
Cultures diverses						
Traitements généraux						

*Usage non présent dans l'index de 1990 à 1998 inclus

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : -
- solubilité dans l'eau : 0,5 mg/l à 20°
- spectre : large
- persistance d'action : 8 à 10 jours

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R 22/23 T DL50 rat par ingestion : 638 mg/kg	R40 DJA : 0,01 mg/kg/jour	R41	R43		R 50/53	Dangereux pour les poissons
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Delan liquide (1966)

Évolution de formulation : WG (1999)