

**Etofenprox**

Synonyme :


Famille : Éthers aromatiques

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 <sup>er</sup> janvier 2010			

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>	2013	→	Colza, moutarde	X		
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>	2002	→	Choux	X		
<b>Cultures ornementales</b>	1997	2013	Rosier, arbres et arbustes d'ornement	X		
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>						
<b>Cultures diverses</b>	2013	→	Cultures porte graines mineures (PPAM...)	X		
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage	2013	→		X		
Bâtiments d'élevage	2013	→		X		

Caractéristiques (2013) :

- action : par contact et ingestion
- solubilité dans l'eau : <1 µg/l à 25°C
- spectre : grand nombre d'insectes nuisibles : lépidoptères, hémiptères, coléoptères, diptères et orthoptères
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : >2000 mg/kg	DJA : 0,03 mg/kg/jour				R50/53	
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Trebon 30 EC (1994)

Évolution de formulation : -