

Fluorochloridone

Synonyme : R40244, Flurochloridone


Famille : Pyrrolidones

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} juin 2011			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

Grandes cultures	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>	1985	1998	Céréales d'hiver		X	Néburon
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>	1985	→	Tournesol	X		
<i>Pomme de terre</i>	1986*	→		X		
<i>Protéagineux</i>	1987	→	Pois protéagineux de printemps		X	Néburon
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	1993**	→	Tomate	X		
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses	2005	→	PPAM	X		
Traitements généraux						

* Usage non présent dans l'index de 1996 à 2002 inclus

** Usage non présent dans l'index de 1999 à 2004 inclus

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : racinaire et foliaire
- solubilité dans l'eau : 28 mg/l à 20°C
- spectre : Nombreuse dicotylédones, certaines graminées
- persistance d'action : trois et demi

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : 4000 mg/kg	H361				H400 H410	Très toxique pour les organismes aquatiques
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Racer (1983)

Évolution de formulation : CS