

**Fluorure de sulfuryle**

Synonyme :


Famille : -

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 <sup>er</sup> novembre 2010			

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

FLUORURE DE SULFURYLE  
18/06/2014

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petit fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>						
<b>Cultures ornementales</b>						
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>						
<b>Cultures diverses</b>						
<b>Traitements généraux</b>						

FLUORURE DE SULFURYLE  
18/06/2014

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées	2012	→	Traitements des bois abattus, produits récoltés	X		
Locaux de stockage	2012	→		X		
Bâtiments d'élevage						

FLUORURE DE SULFURYLE  
18/06/2014

Caractéristiques (2013) :

- action : -
- solubilité dans l'eau : 1,04 mg/l
- spectre : Insectes des denrées stockées, du bois et le nématode du pin
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		T R20/23 DL50 rat par ingestion : 100 mg/kg	DJA : 0,014 mg/kg/jour				R50	
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Profume (2005)

Évolution de formulation : non