

Fonofos

Synonyme : Fonophos


Famille : Organo-phosphorés

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>	1990	1996	blé	X		
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières						
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses						
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences	1988	1998	blé	X	X	Oxyquinoléate de cuivre Anthraquinone
Traitement de sols	1970	2000	Toutes cultures, maïs, oignon, carotte, bananier	X		
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (1998) :

- action : contact et ingestion
- solubilité dans l'eau : 13 mg/l à 22°C
- spectre : large
- persistance d'action : 2 à 3 mois

Toxicité (1998) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R27/28 T+ DL50 rat ingestion : 8-17.5 mg/kg	DJA : 0.005 mg/kg/jour				R50/53	
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Dyfonate 5G (1969)

Évolution de formulation : -