

**Formétanate**

Synonyme :


Famille : Carbamates

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>	1972	2011		X		
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>	1970	1978		X	X	Chlorphénamide Chordimeforme
<i>A noyaux</i>	1970	1977		X	X	Chlorphénamide Chordimeforme
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autre</i>						
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>	1970	2011	Melon, tomate, fraisier et poireaux	X	X	Chlorphénamide
<b>Cultures ornementales</b>	1970	2011	Cultures florales diverses	X	X	Chlorphénamide Chordimeforme
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>						
<b>Cultures diverses</b>	1970	1977	Houblon		X	Chlorphénamide Chordimeforme
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2011) :

- action : par contact et ingestion
- solubilité dans l'eau : >822 mg/l à 25° C
- spectre : thrips et pégomyie
- persistance d'action :

Toxicité (2011) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		T+ R26/R28 DL50 rat par ingestion : 14,8 mg/kg			R43		R50/53	Dangereux pour les abeilles
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Fundal forte

Évolution de formulation : SP