

Indoxacarbe

Synonyme :


Famille : Oxadiazines

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} avril 2006			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>	2011	→		X		
<i>Oléagineux</i>	2013	→	Colza, moutarde blanche	X		
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>	2011	→	Abricotier, pêcher	X		
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	2004	→	Choux, maïs doux, melon, tomate, courgette,.....	X		
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture	2004	→		X		
Cultures diverses						
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : par contact et ingestion
- solubilité dans l'eau : 0,2 ppm
- spectre : principalement sur lépidoptères
- persistance d'action : 21 jours sur la tordeuse orientale

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R22 DL50 rat par ingestion : 1730 mg/kg	DJA : 0,006 mg/kg/jour	Xn	R43		R50/53	
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Steward (1998)

Évolution de formulation : EC