

Méfenpyr-diéthyl

Synonyme :


Famille : Pyrazoles

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>	2000	→	Céréales		X	***
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières						
Cultures ornementales	2006	→	Gazons de graminées		X	Fénoxaprop-éthyl
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses	2007	→	Lin textile		X	Iodosulfuron-méthyl sodium Amidosulfuron
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

MÉFENPYR-DIÉTHYL
21/05/2014

Caractéristiques (2013) :

- action : phytoprotectrice
- solubilité dans l'eau : 20 mg/l à 20°C
- spectre : -
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : >5000 mg/kg	DJA : 0,5 mg/kg/jour				R51	
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Baghera (1996)

Évolution de formulation : OD