

**Métalaxyl**

Synonyme : Métaxanine


Famille : Amines, Amides (phénylamides)

Groupes : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>	1981	2001			X	Cuivre Folpel Manèbe
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>	1988	2002	Tomate, fraisier, melon, salsifis, carotte, concombre, cornichon		X	Folpel Manèbe
<b>Cultures ornementales</b>						
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>	1979	2002			X	Cuivre Folpel
<b>Cultures diverses</b>	1981	2002	Houblon, tabac		X	Cuivre Folpel Manèbe
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

Traitement de semences	1983	2002	Betterave, tournesol, maïs, pois, crucifères oléagineuses	X	X	***
Traitement de sols	1992	2002	Carotte, fraisier, framboisier et autres rubus		X	Manèbe Folpel
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2002) :

- action : par systémies
- solubilité dans l'eau : 7100 mg/l à 20° C
- spectre : Nombreux champignons
- persistance d'action : -

Toxicité (2002) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R22 DL50 rat par ingestion : 669 mg/kg	DJA : 0,03 mg/kg/jour	Xn				
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Acylon bleu (1978)

Évolution de formulation : -