

Méthoprène

Synonyme :


Famille :

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières						
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses						
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols	1992	2003		X		
Denrées entreposées	1988	1991		X		
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2003) :

- action : néant
- solubilité dans l'eau : 1,4 mg/kg
- spectre : Coléoptères (Tribolium, Sylvains, Lasioderme), des Lépidoptères (Ephestia), des Diptères (mouches domestiques).....
- persistance d'action : néant

Toxicité (2003) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : >34000 mg/kg	DJA : 0,5 mg/kg/jour					
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Kabat (1986) pour usage agricole, Altocide SR 10 pour usage biocide

Évolution de formulation : EC