

Nuarimol

Synonyme :


Famille : Pyrimidines

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>	1985	1993	Orge d'hiver et de printemps	X		
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>	1987	1990	Pommier, poirier		X	Captane, mancozèbe
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières						
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture	1985	2000		X		
Cultures diverses						
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences	1983	2001	Orge, blé, avoine		X	Manebe, lindane, anthraquinone
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2003) :

- action : par systémie
- solubilité dans l'eau : 26 mg/l à 25°C
- spectre : Nombreux champignons parasites cultures
- persistance d'action : Néant

Toxicité (2003) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : 2000 mg/kg						
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Trimisem total (1981)

Évolution de formulation : non