

Oxydéméton-méthyl

Synonyme :


Famille : Organo-phosphorés

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

Grandes cultures	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<i>Betterave</i>	1963	2008		X	X	Betacyfluthrine Esfenvalérate Trichlorfon
<i>Céréales</i>	1980	2008			X	Betacyfluthrine Esfenvalérate
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>	1992	2008	Crucifères oléagineuses, tournesol, colza		X	Betacyfluthrine
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>	1992	2008	Pois protéagineux (hiver/printemps)		X	Betacyfluthrine Esfenvalérate
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>	1963	2008	Pommier, poirier...	X	X	Betacyfluthrine
<i>A noyaux</i>	1963	1997	Prunier, pêcher, abricotier	X	X	Betacyfluthrine
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>	1994	1997	Amandier, figuier, châtaignier, noyer, noisetier		X	Betacyfluthrine
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>	2002	2008	Pois de conserve		X	Esfenvalérate
<b>Cultures ornementales</b>	1975	2008	Rosier	X		
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>	1963	1992		X		
<b>Cultures diverses</b>	2005	2008	Cultures porte- graine mineures		X	Betacyfluthrine
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2008) :

- action : systémique par contact et ingestion
- solubilité dans l'eau : miscible à l'eau
- spectre : large
- persistance d'action : bonne

Toxicité (2008) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R24/25 T DL50 rat par ingestion : 65 à 80 mg/kg	DJA : 0.0003 mg/kg/jour				R50	Dangereux pour gibier, poissons et abeilles
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Meta systemox R (1961)

Évolution de formulation : -