

Parathion éthyl

Synonyme : Parathion (1961-1974)


Famille : Organo-phosphorés

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

| INSCRITE | NON INSCRITE | REVISION | |
|----------|--------------|----------|--|
| | | | |

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

PARATHION ÉTHYL
07/06/2013

Usages :

PARTIES AERIENNES

| Grandes cultures | 1 ^{ère} édition | Dernière édition | Cultures particulières | Utilisation seule | Utilisation en associations | Remarques |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------------------|--|
| <i>Betterave</i> | 1961 | 2002 | | X | X | Diéthion Endosulfan |
| <i>Céréales</i> | | | | | | |
| <i>Maïs</i> | 1971 | 1992 | | X | | |
| <i>Oléagineux</i> | 1961 | 2002 | Crucifères oléagineuses | X | X | Endosulfan Lindane |
| <i>Pomme de terre</i> | 1961 | 1992 | | | X | Endosulfan |
| <i>Protéagineux</i> | | | | | | |
| Arbres fruitiers | | | | | | |
| <i>A pépins</i> | 1961 | 2002 | Pommier, poirier, cognassier, nashi | X | X | *** |
| <i>A noyaux</i> | 1961 | 2002 | Pêcher, cerisier, abricotier, prunier | X | X | Oléoparathion Endosulfan Lindane |
| <i>Petits fruits</i> | 1994 | 2002 | Cassissier | X | | |
| <i>Agrumes</i> | 1985 | 2002 | | X | | |
| <i>Autres</i> | 1994 | 2002 | Amandier, châtaigner, noisetier, figuier, noyer, olivier | X | | |
| Cultures forestières | | | | | | |
| Cultures légumières | 1961 | 2002 | Pois, melon, laitue, chou, poireau, fraisier | X | X | Diéthion Endosulfan Lindane |
| Cultures ornementales | 1961 | 2002 | Arbustes d'ornement, rosier, glaïeul | X | X | Diéthion Endosulfan Lindane |
| Cultures tropicales | 1975 | 1991 | | X | | |
| Viticulture | 1961 | 2002 | | X | X | Oléoparathion Endosulfan |

PARATHION ÉTHYL
07/06/2013

| | | | | | | |
|----------------------|------|------|-----------------------------|---|---|------------|
| | | | | | | Diéthion |
| Cultures diverses | 1975 | 2002 | Légumineuses fourragères | X | X | Endosulfan |
| Traitements généraux | | | | | | |

AUTRES

| | | | | | | |
|------------------------|------|------|-----------------|---|---|-----------------------|
| Traitement de semences | | | | | | |
| Traitement de sols | 1961 | 1995 | Toutes cultures | X | X | Endosulfan Lindane |
| Denrées entreposées | | | | | | |
| Locaux de stockage | | | | | | |
| Bâtiments d'élevage | | | | | | |

PARATHION ÉTHYL
07/06/2013

Caractéristiques (2002) :

- action : contact, ingestion et inhalation
- solubilité dans l'eau : 24 mg/l à 25°C
- spectre : large
- persistance d'action : quelques jours

Toxicité (2002) :

| | Physicochimie | Toxicité | | | | Écotoxicité | | |
|-------------|----------------|---|---------------------------|----------|---------------|-------------|-----------|----------|
| | Inflammabilité | Aiguë | Chronique | Irritant | Sensibilisant | N | Phrases R | Mentions |
| Molécule | | R27/28 T+ DL50 rat ingestion : 3.6-13 mg/kg | DJA : 0.004 mg/kg/jour | | | | R50/53 | |
| Spécialités | | | | | | | | |

1^{ère} spécialité commerciale : Typhon 10 (1945)

Évolution de formulation : -