

Procymidone

Synonyme :


Famille : Dicarboximides

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>	1984	2007	Crucifères oléagineuses	X		
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>	1986	2007	Pois protéagineux (hiver/printemps)	X		
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>	1987	2008	Prunier, pêcher, abricotier,	X		
<i>Petits fruits</i>	1994	2007	Framboisier...	X		
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>	1994	2007	Amandier, kiwi, noisetier	X		
Cultures forestières						
Cultures légumières	1981	2008	Tomate, fraisier, laitue, haricot, choux, melon, courgette, pois de conserves...	X		
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture	1979	2007		X		
Cultures diverses						
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences	1987	2007	Ail, chicorée Witloof, échalote	X		
Traitement de sols	1993	2007	Chicorée Witloof	X		
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2010) :

- action : par contact, préventive et curative
- solubilité dans l'eau : 4,5 mg/l à 25° C
- spectre : *Botrytis cinerea*, Sclérotinioses, Monilioses et Alternarioses
- persistance d'action : -

Toxicité (2010) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : 6800 mg/kg	DJA : 0,1 mg/kg/jour					
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Sumislex (1977)

Évolution de formulation : non