

**Propargite**

Synonyme :


Famille : Sulfites

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

Grandes cultures	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>	1992	1995		X		
<i>Oléagineux</i>	1992	1995	Soja	X		
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>	1975	2011	Pommier	X		
<i>A noyaux</i>	1975	2011	Abricotier, pêcher, prunier	X		
<i>Petits fruits</i>	2007	2011	Cassissier	X		
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>	2007	2011	Noyer, noisetier	X		
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>						
<b>Cultures ornementales</b>						
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>	1975	2011		X	X	***
<b>Cultures diverses</b>	1998	2011	Houblon	X		
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2011) :

- action : par contact et vapeur
- solubilité dans l'eau : 0,5 mg/l à 25°C
- spectre : Acariens
- persistance d'action : néant

Toxicité (2011) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		T-R23 DL50 rat par ingestion : 2200 mg/kg	DJA : 0,02 mg/kg/jour	R40	R38/41		R50/53	Dangereux pour les poissons
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Omite 30 W

Évolution de formulation : WP-EW