

**Pyrazophos**

Synonyme :


Famille : Pyrazolopyrimidines

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>	1987	2000	Orge, escourgeon		X	***
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>	1976	2000	Pommier, poirier...	X		
<i>A noyaux</i>	1979	2000	Abricotier, pêcher	X		
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>	1994	2000	Noisetier	X		
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>	1976	2000	Cucurbitacées	X		
<b>Cultures ornementales</b>						
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>						
<b>Cultures diverses</b>						
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2000) :

- action : systémique par contact, préventive et curative
- solubilité dans l'eau : 3,3 mg/l à 20°C
- spectre : Oïdiums
- persistance d'action : -

Toxicité (2000) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R22 DL50 rat par ingestion : 286 à 632 mg/kg	DJA : 0,004 mg/kg/jour	Xn				Dangereux pour les poissons
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Afugan Procida (1974)

Évolution de formulation : -