

Séthoxydime

Synonyme :


Famille : Cyclohexane-diones

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>	1986	2003	*	X		
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>	1986	2003	*	X		
<i>Pomme de terre</i>	1986	2003	*	X		
<i>Protéagineux</i>	1986	2003	*	X		
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>	1986	2003	*	X		
<i>A noyaux</i>	1986	2003	*	X		
<i>Petits fruits</i>	1986	2003	*	X		
<i>Agrumes</i>	1986	2003	*	X		
<i>Autres</i>	1986	2003	*	X		
Cultures forestières	1986	2003	*	X		
Cultures légumières	1986	2003	*	X		
Cultures ornementales	1986	2003	*	X		
Cultures tropicales	1986	2003	*	X		
Viticulture	1986	2003	*	X		
Cultures diverses	1986	2003	*	X		
Traitements généraux						

*Toutes cultures (sauf graminées cultivées)

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2003) :

- action : par systémie
- solubilité dans l'eau : 24,5 à 25° C
- spectre : Graminées annuelles et vivaces
- persistance d'action : 10 jours

Toxicité (2003) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : 3125 mg/kg						
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Fervinal (1981)

Évolution de formulation : EC