

S-métolachlore

Synonyme :


Famille : Chloroacétanilides

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} avril 2005			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

Grandes cultures	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<i>Betterave</i>	2004	→	Betterave fourragère, industrielle	X		
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>	2003	→	Maïs, sorgho	X	X	Bénoxacor Mésotrione
<i>Oléagineux</i>	2003	→	Tournesol, soja	X		
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	2003	→	Maïs doux, haricot, porte-graine courgette et potiron	X	X	Mésotrione Bénoxacor
Cultures ornementales						
Cultures tropicales	2005	→	Canne à sucre, ananas, coloquinte porte-graine	X	X	Mésotrione Bénoxacor
Viticulture						
Cultures diverses						
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : racinaire
- solubilité dans l'eau : 480 mg/l à 25°C
- spectre : Graminées estivales
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : >2000 mg/kg	DJA : 0,1 mg/kg/jour	Xi	R43		R50/53	
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Mercantor Gold (1998)

Évolution de formulation : non