

**Tébufenpyrad**

Synonyme :


Famille : Amines, Amides (pyrazol-carboxamides)

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 <sup>er</sup> novembre 2009			

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>	1995	→	Pommier, poirier, cognassier, nashi	X		
<i>A noyaux</i>	1997	→	Pêcher, prunier	X		
<i>Petits fruits</i>	2007	→	Framboisier	X		
<i>Agrumes</i>	2007	→		X		
<i>Autres</i>						
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>						
<b>Cultures ornementales</b>	2010	→	Arbres et arbustes d'ornement, Cultures florales	X		
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>	1997	→		X	X	Bifenthrine
<b>Cultures diverses</b>						
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : par contact et ingestion
- solubilité dans l'eau : 2,6 mg/l à 25°C
- spectre : Acarien rouge
- persistance d'action : 6 semaines

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R20/22 DL50 rat par ingestion : 595 à 997 mg/kg	DJA : 0,01 mg/kg/jour	Xn-R36			R50/53	Dangereux pour la faune aquatique
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Masai (1991)

Évolution de formulation : non