

**Toxaphène**

Synonyme :


Famille : Organo-phosphorés

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>	1969	1984		X		
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>	1961	1984	Colza	X		
<i>Pomme de terre</i>	1969	1984		X		
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>						
<b>Cultures ornementales</b>						
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>						
<b>Cultures diverses</b>	1961	1984	Lucerne et autre légumineuse	X		
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols	1973	1984	Noctuelles terricoles	X		
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (1984) :

- action :
- solubilité dans l'eau :
- spectre :
- persistance d'action :

Toxicité (1984) : Modérément dangereux

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		Tableau A ou C pour les teneurs <=20% DL50 rat par ingestion : 90 mg/kg						Dangereux pour les poissons
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Sopraphène liquide (1945)

Évolution de formulation : LP