

**Triallate**

Synonyme :


Famille : Carbamates

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

Grandes cultures	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<i>Betterave</i>	1966	→	Betterave industrielle et fourragère	X		
<i>Céréales</i>	1963	→	Orge de printemps, blé tendre et dur, escourgeon	X		
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>	1963	→	Lin oléagineux, tournesol, colza	X		
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>	1989	→	Pois protéagineux de printemps et d'hiver	X		
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>	1994	→	Pois de conserve, épinard	X		
<b>Cultures ornementales</b>						
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>						
<b>Cultures diverses</b>	1963	→	Lin textile, luzerne, trèfle divers	X		

Traitements généraux						
----------------------	--	--	--	--	--	--

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : racinaire
- solubilité dans l'eau : 3 mg/l à 24°C
- spectre : Graminées
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R22 DL50 rat par ingestion : 1675 à 2165 mg/kg	DJA : 0,001 mg/kg/jour	Xn	R43		R50/53	
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Avadex B W (1962)

Évolution de formulation : EC