

Triticonazole

Synonyme :


Famille : Triazoles

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} février 2007			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Mais</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières						
Cultures ornementales	2012	→	C. florales diverses, rosier, arbres/arbustes d'ornement	X	X	Acétamipride
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses						
Traitements généraux						

TRITICONAZOLE
03/07/2014

AUTRES

Traitement de semences	1994	→	Céréales, maïs	X	X	Prochloraze Anthraquinone
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : systémique
- solubilité dans l'eau : 7 mg/l à 20°C et à pH 5
- spectre : large
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 rat par ingestion : > 2000 mg/kg	DJA : 0,0125 mg/kg/jour	R36 Xi			R51/53	
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Real (1993)

Évolution de formulation : -