

Verticillium lecanii

Synonyme : Lecanicillium lecanii


Famille : Clavicipitaceae

Groupe : Moyens biologiques/Préparations fongiques

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} avril 2009			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

VERTICILLIUM LECANII
12/07/2014

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	2006	→	Aubergine, concombre, fraisier, tomate	X		
Cultures ornementales	2006	→	Cultures florales diverses, rosier	X		
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses						
Traitements généraux						

VERTICILLIUM LECANII
12/07/2014

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : par contact
- solubilité dans l'eau :
- spectre : Trialeurodes, aleurodes
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) : pas de toxicité

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule								
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Mycotal (2004)

Évolution de formulation : non